

Maladie	Signes et Symptômes	Quand consulter un médecin	Exclusion et retour au centre
Fièvre	Une température plus élevée que 98.6 F (37.0 C) est considérée une fièvre. Des autres signes peuvent inclure: transpiration, frissonner, mal de tête, douleurs musculaires, perte d'appétit, devenir déshydraté., la faiblesse.	Consulter un médecin si la température de l'enfant est plus que 102.2 F (39.0 C). Consulter un médecin si la température est moins que 102.2 F (39.0 C) mais présente ces symptômes: refuser à boire, à la diarrhée persistante, ou vomit à plusieurs reprises, semble déshydraté, à la fièvre pendant plus que 24 heures, est léthargique, a une raideur du cou ou des douleurs abdominales.	Les parents seront appelés à venir chercher leur enfant de la garderie si l'enfant a une fièvre de plus de 100.4 F (38.0 C). L'enfant peut retourner à la garderie une fois qu'il n'a pas de fièvre pour 24 heure consécutive sans aide de médicaments.
Diarrhée	Selles liquides et fréquentes, crampes abdominales, douleurs abdominales, fièvre, saignement, étourdissements ou vertiges de devenir déshydraté.	Consulter un médecin si l'enfant n'a pas mouillé sa couche à 3 heures ou plus, a une fièvre de plus de 100.4 F (38.0 C), a des selles sanglantes ou noires, a la bouche sèche ou cris sans larmes, est anormalement somnolent, assoupi, ne répond pas ou irritable, a une apparence creuse de l'abdomen, les yeux ou les joues, à la peau qui ne s'aplatit pas si coincer et libéré.	Les parents seront appelés à venir chercher leur enfant de la garderie après le deuxième épisode de diarrhée ou après le premier épisode de diarrhée avec le sang dans les selles. L'enfant peut retourner à la garderie une fois qu'il n'a pas eu d'épisodes de diarrhée pour 24 heures consécutives sans aide de médicaments.
Vomissement	Le vomissement est le résultat du contenu de l'estomac étant expulsés de force par la bouche. Des autres signes peuvent inclure: mal d'estomac, vertiges, anxiété et peut conduire à devenir déshydraté.	Consulter un médecin si l'enfant n'a pas été en mesure de garder les liquides pendant 8 heures et montre des signes d'être déshydraté., le vomissement est accompagné d'une forte migraine, douleurs thoraciques, troubles de la vision, raideur de la nuque ou des matières fécales ou d'odeur dans les vomissures, les vomissures contiennent du sang, est vert ou ressemble à du marc de café.	Les parents seront appelés à venir chercher leur enfant de la garderie si l'enfant a eu deux épisodes de vomissement. L'enfant peut retourner à la garderie une fois qu'il n'a pas vomi pour 24 heures consécutives sans aide de médicaments.
Grippe	Forte fièvre, mal de tête, douleur musculaire, la faiblesse, la fatigue, mal de gorge, nez qui coule, une toux sévère et prolongée.	Consultation d'un médecin n'est pas nécessaire mais traité la fièvre et prendre beaucoup de repos.	L'enfant doit être exclu de la garderie jusqu'à ce qu'il se sent mieux et peut participer dans les activités.
Poux de tête	Tête est des démangeaisons, des poux dans les cheveux ou des lentes sur la tige du cheveu. Trouvé généralement derrière les oreilles ou sur la nuque.	La consultation d'un médecin n'est pas nécessaire mais le shampooing médicamenteux est nécessaire.	L'enfant peut retourner à la garderie une fois qu'il a été traité avec le shampooing et toutes les lentes ont été supprimés. Le lavage des articles personnels et de la literie à l'eau chaude ou scellés dans des sacs en plastique pour 10 jours est nécessaire.
Teigne	Plaies sur la peau qui sont plats et en forme d'anneau.	Consulter un médecin pour une prescription médicament.	L'enfant doit être exclu de la garderie jusqu'à ce que le traitement a commencé et les signes de guérison sont présents.
Angine à Streptocoque	Fièvre, malaise, mal de gorge, les ganglions lymphatiques dans le cou gonflées et enflés.	Consulter un médecin pour une prescription d'antibiotiques.	L'enfant doit être exclu de la garderie jusqu'à ce qu'il ait traité pour 24 heures consécutives.
Conjonctivite	Yeux qui sont douloureux, les larmes, les démangeaisons, et sensible à la lumière. Surface des yeux est de couleur rose ou rouge. Yeux ont un écoulement épais jaune.	Consulter un médecin pour une prescription de gouttes pour les yeux.	L'enfant doit être exclu de la garderie jusqu'à ce qu'il ait traité pour 24 heures consécutives et les yeux s'améliorent.
Fièvre écarlate	Une forme d'infection streptococcique qui produit une éruption cutanée fine et rouge sur le devant du corps (pas le visage) qui ressemble à du papier de verre. Fièvre, malaise, mal de gorge, les ganglions lymphatiques dans le cou gonflées et enflés.	Consulter un médecin pour une prescription d'antibiotiques.	L'enfant doit être exclu de la garderie jusqu'à ce qu'il ait traité pour 24 heures consécutives.
Gale	D'intenses démangeaisons éruption rouge (surtout la nuit), trouvée entre les doigts, sur les poignets, sous les bras, et dans les bas de l'abdomen ou les fesses. Les mites terriers peuvent être vu sous la peau, mais ils sont généralement détruits par le grattage.	Consulter un médecin pour une prescription de crème ou lotion médicamenteux pour la peau pour toute la famille.	L'enfant doit être exclu de la garderie jusqu'à ce qu'il ait traité pour 24 heures consécutives. Le lavage des articles personnels et de la literie à l'eau chaude ou scellés dans des sacs en plastique pour 3 jours est nécessaire.

Giardia	La diarrhée fréquente, des selles pâles gras, crampes d'estomac, gaz, nausées, vomissements, ballonnements, une perte de poids et la faiblesse. Fièvre, éruption cutanée et des douleurs articulaires sont moins fréquentes.	Consulter un médecin pour une prescription d'antibiotiques.	L'enfant doit être exclu de la garderie jusqu'à ce qu'il ait traité pour 24 heures consécutives.
Impétigo	Plaies sur le corps qui se propagent et sont croustillants et suintant.	Consulter un médecin pour une prescription médicament.	L'enfant doit être exclu de la garderie jusqu'à ce qu'il ait traité pour 24 heures consécutives.
Rougeole (red measles)	Fièvre, maux et douleurs, nez qui coule, les yeux rouges et enflammés, mal d'oreille, une toux. 2 à 4 jours plus tard: une éruption rouge et tachetée, de grandes taches rouges sur le visage et la tête, puis se rendre le long du corps, les bras et jambes, s'estompe au bout d'environ une semaine.	Deux doses de vaccin ROR; la première à 12 mois et la deuxième à 4 - 6 ans.	L'enfant doit être exclu de la garderie pour au moins 4 jours après l'apparition de l'éruption et l'enfant est assez bien pour participer dans les activités.
Coqueluche	Nez qui coule, fièvre. Une toux qui s'aggrave dans des quintes. À la fin d'une quinte de toux, le son "whoop" se fait entendre lorsque l'enfant prend une profonde inspiration.	Consulter un médecin pour une prescription d'antibiotiques.	L'enfant doit être exclu de la garderie jusqu'à ce qu'il ait traité pour 5 jours consécutives. Si l'enfant n'a pas été traité, il est exclu de la garderie pour 3 semaines à partir de début de la toux.
COVID-19	Fièvre, toux, mal de gorge/voix roque, difficulté à respirer/essoufflement, perte de l'odorat et/ou du goût, vomissement, diarrhée, nez qui coule, muscles endoloris, fatigue, conjonctivite, mal de tête, éruption cutanée de cause inconnue, nausée/perde d'appétit.	Consultation d'un médecin n'est pas nécessaire sauf si les difficultés respiratoires deviennent graves. Un test PCR ou un test rapide est recommandé pour confirmer un résultat positif.	La recommandation pour les symptômes est une période d'isolement de 5 jours. Pour un résultat de test positif, la période d'isolement obligatoire est de 5 jours.
Hépatite A	Jaunisse (jaunissement de la peau et les yeux), malaise, perte d'appétit, douleur à l'estomac, urine foncée, fatigue. Possiblement une fièvre, vomissements et la diarrhée.	Consulter un médecin si vos signes et symptômes ne disparaissent pas, s'aggravent ou si vous êtes concerné.	L'enfant doit être exclu de la garderie pour une semaine après l'apparition de la maladie et si l'enfant ne peut pas participer dans les activités.
Rubéole (german measles)	Fièvre faible, maux et douleurs, des yeux rouges, gonflement des ganglions lymphatiques. Une éruption de petites taches rouge qui se gratte apparaît sur le visage et le cuir chevelu. L'éruption se propage rapidement vers le bas du corps et s'estompe dans 1 - 3 jours.	Deux doses de vaccin ROR; la première à 12 mois et la deuxième à 4 - 6 ans.	L'enfant doit être exclu de la garderie pour au moins 7 jours après l'apparition de l'éruption. Alerter les femmes enceintes si elles ont eu de contact avec l'enfant infecté.
Oreillons (mumps)	Fièvre, mal de tête, mal au ventre, somnolence, enflée et douloureuse derrière la glande parotide (au coin de la mâchoire).	Deux doses de vaccin ROR; la première à 12 mois et la deuxième à 4 - 6 ans.	L'enfant doit être exclu de la garderie pour 9 jours après le gonflement apparaît.
Tuberculose	Un toux qui dure plus de 3 semaines, perte d'appétit, la perte des poids, sueurs nocturnes, fièvre, frissons, fatigue, douleur à la poitrine, crachats de sang.	Consulter un médecin si les symptômes persistent. Une radiographie pulmonaire et un test de salive doivent être effectués pour diagnostiquer la tuberculose. Si le test est positif, les antibiotiques sont nécessaires pour au moins de 6 mois.	L'enfant doit être exclu de la garderie pour 2 à 4 semaines après le début de traitement.
5 ^e maladie	Fièvre bas, éruption cutanée sur les joues et le long du corps (plus évident dans la chaleur et le soleil, tendresse et douleur dans les articulations).	Consultation d'un médecin n'est pas nécessaire.	L'exclusion de la garderie n'est pas nécessaire, sauf si l'enfant n'est pas assez bien pour participer aux activités. Essayez d'éviter les femmes enceintes.
Bronchite	Un toux persistant accompagné de mucus ou de phlegme, fatigue, fièvre basse et des frissons, douleurs à la poitrine.	Consulter un médecin si le toux dure plus de 3 semaines, ça vous empêche de dormir, c'est accompagné d'une fièvre supérieure de 100.4 F (38.0 C) ou plus, ça produit du mucus décolorés ou du sang, c'est associée à une respiration sifflante ou essoufflement.	L'exclusion de la garderie n'est pas nécessaire, sauf si l'enfant n'est pas assez bien pour participer aux activités.
Éruption cutanée	Démangeaisons, bosses rouges sur la peau, croûtes, sécheresse, écaillage, lésions (ampoules, papules, pustules), gonflement, chaleur.	Consulter un médecin si l'éruption cutanée s'aggrave, dure plus d'une semaine, montres des signes d'infection (suintement, rougeur ou gonflement, si	Les parents seront appelés à venir chercher leur enfant de la garderie afin d'obtenir un diagnostic par un médecin. Une note de médecin indiquant que l'éruption n'est pas contagieuse est

		l'enfant obtient une fièvre, des frissons, des glands enflés, est fatigué, a une perte de poids inexplicquée, ou de l'enflure des articulations.	nécessaire avant que l'enfant puisse retourner à la garderie. Si l'enfant est dans l'inconfort et ne peuvent pas participer aux activités, les parents seront appelés à venir chercher leur enfant de la garderie.
Maladie main-pied-bouche	Fièvre, mal de tête, mal de gorge, perte d'appétit, manque d'énergie, présence de petites ulcères douloureux dans la bouche, éruption cutanée sous la forme de petits boutons rouge souvent surmontés de petites vésicules, et qui apparaissent sur les mains et les pieds, et parfois sur d'autres parties du corps.	La consultation d'un médecin n'est pas nécessaire.	L'exclusion de la garderie n'est pas nécessaire, sauf si l'enfant n'est pas assez bien pour participer aux activités.
Varicelle	Ampoules dispersées qui peuvent apparaître sur tout le corps, une fièvre faible. Les ampoules se transforment en pustules. Pustules se transforment en croûtes.	Un vaccin est disponible pour les enfants de 12 mois, 4 ans et 9 ans s'ils sont à risque. Traiter les démangeaisons et la fièvre, empêcher l'enfant de se gratter.	L'exclusion de la garderie n'est pas nécessaire, sauf si l'enfant n'est pas assez bien pour participer aux activités.